

## DIFENDERSI DALLE ZANZARE

Alcuni semplici interventi possono essere utili a ridurre la diffusione delle zanzare:

**IN ORTI E GIARDINI:** eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; diversamente coprire con coperchi ermetici, teli di plastica o zanzariere ben tese, tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'acqua piovana da irrigazione (cisterne, secchi, annaffiatoi, bidoni e bacinelle);

**IN CORTILI E CONDOMINI:**

- pulire un paio di volte all'anno tombini e pozzetti;
- applicare una zanzariera a maglia fine sopra al tombino per impedire alle zanzare di deporvi le uova;
- trattare ogni 15 giorni circa i tombini e le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi.

**NELLE GRONDAIE:** verificare che siano pulite e non ostruite.

**NEI CIMITERI:** introdurre il prodotto larvicida nei vasi di fiori freschi o in alternativa riempire i vasi portafiori con sabbia umida, al posto dell'acqua. Anche in caso di utilizzo di fiori finti riempire di sabbia il vaso, se collocato all'aperto.

**NEI SOTTOVASI:** non far ristagnare acqua al loro interno e, se possibile, eliminarli.

**NEGLI ABBEVERATOI DI ANIMALI:** cambiare quotidianamente l'acqua e lavarli con cura.

**E' IMPORTANTE:**

- non accumulare, all'aperto, copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua stagnante; se ciò non fosse possibile, disporli a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua e coprirli con un telo. Per i materiali che non possono essere coperti, effettuare idonea disinfestazione entro 5 giorni dopo la pioggia;
- non lasciare che l'acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiali;
- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possono raccogliere e trattenere acqua piovana (es. annaffiatoi o secchi, piscine gonfiabili, ecc.);
- introdurre pesci rossi, grandi predatori delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane dei giardini.